HYDRAFLEX 60

Sabor uva

Solución Oral

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted. Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico.

COMPOSICIÓN

Cada 100 ml de solución oral contiene:

Fórmula de Composición	HYDRAFLEX 60 SABOR UVA
Cloruro de Sodio	175,7 mg
Dextrosa monohidrato	1188,0 mg
Gluconato de Zinc	6,0 mg
Citrato de sodio dihidrato	289,2 mg
Cloruro de Potasio	150,6 mg
Excipientes:	Aroma Uva, Color Uva (3), Sucralosa, Acesulfamo de Potasio, Ácido Cítrico Anhidro, Agua purificada. (3) Colorante se encuentra compuesto por: C.I. N° 16035 - FD&C Red No. 40 (Allura Red). C.I. N° 42090 - FD&C Blue No 1 (Brilliant Blue)

GRUPO FARMACOTERAPÉUTICO

Tracto alimentario y Metabolismo. Electrolitos con carbohidratos. Formulación de sales de rehidratación oral

INDICACIONES FARMACOLÓGICAS

Para el tratamiento de deshidratación moderada por pérdidas de líquidos o electrolitos. Contiene zinc para ayudar a reponer el zinc perdido durante la deshidratación por pérdida de líquidos y electrolitos.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN Vía Oral.

POSOLOGÍA

Después de cada episodio de diarrea la cantidad recomendada es:

- Menores de 1 año: consulte a su médico
- Menores de 2 años: de 50 a 100 ml
- De 2 a 10 años: de 100 a 200 ml
- Mayores de 10 años y adultos: tanto líquido como sea necesario.

Cantidad aproximada en las primeras 4 horas (*)		
Edad	Peso (Kg)	ml
12 a 23 meses	8-10,9	600-800
2 a 4 años	11-15,9	800 - 1200
5 a 14 años	16-29,9	1200 - 2200
Mayor 15 años	Más de 30	2200 - 4000

(*) Si hay vómito o fiebre o si la diarrea persiste por más de 24 horas consulta a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Contraindicado en pacientes con vómito intratable, íleo adinámico, insuficiencia renal, obstrucción intestinal, perforación intestinal o deshidratación severa

INTERACCIONES

La absorción de Zinc puede verse reducida por suplementos de hierro, penicilina, preparaciones que contengan fósforo y tetraciclinas. Las dietas ricas en cereales, fibra y fósforo (productos lácteos) obstaculizan la absorción intestinal de zinc, igual que el café si se ingiere con las comidas.

REACCIONES ADVERSAS

Las soluciones orales de rehidratación oral raramente presentan reacciones adversas

FERTILIDAD, EMBARAZO Y LACTANCIA

No hay datos o estos son limitados relativos al uso de Hydrflex 60 solución de rehidratación oral en mujeres embarazadas o durante la lactancia.

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y OPERAR MAQUINARIA.

Hydrflex 60 no afecta su capacidad para conducir o utilizar máquinas.

SOBREDOSIFICACIÓN

En casos de ingesta excesiva de soluciones orales de rehidratación puede aparecer edema a nivel palpebral que por lo general desaparece al interrumpir el tratamiento.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO

No consumir si el sello está roto.

Una vez abierto el frasco consumir dentro de las 24 horas siguientes y desechar el sobrante.

Durante el embarazo o periodo de lactancia consulte a su médico.

Use la edad del paciente para calcular la dosis solo cuando no conozca el peso.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Conservar a una temperatura no mayor a 30°C.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

Si los síntomas persisten consulte a su médico.

Venta Libre

PRESENTACIONES COMERCIALES

Caja x 24 frascos x 500 ml

Frasco x 500 ml

B | BRAUN

Fabricado por:
B. Braun Medical Perú S.A.
Lima – Perú
R.U.C N°. 20377339461

Revisión: Febrero 2025 – Versión 004