

HYDRAFLEX® 30

Sabor coco

Solución Oral

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted. Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico.

COMPOSICIÓN

Cada 100 ml de solución oral contiene:

Cloruro de Sodio	176,8 mg
Citrato de potasio monohidrato	108,2 mg
Dextrosa monohidrato	1780,0 mg
Gluconato de Zinc	2,1 mg
Excipientes:	Aroma de Coco, Sucralosa, Acesulfamo de Potasio, Ácido cítrico anhidro, Agua purificada

GRUPO FARMACOTERAPÉUTICO:

Tracto alimentario y Metabolismo. Electrolitos con carbohidratos. Formulación de sales de rehidratación oral

INDICACIONES FARMACOLÓGICAS

Prevención temprana de la deshidratación leve por pérdida de líquidos y electrolitos. Contiene zinc para ayudar a reponer tempranamente el zinc eliminado durante la pérdida de electrolitos y agua.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN Vía Oral.

POSOLOGÍA

Niños: la cantidad a ofrecer depende del peso y la duración de la actividad.

Para niños de 4-10 años ofrezca 100 – 300 ml antes de la actividad y otros 100-200 ml por cada hora de ejercicio.

Niños mayores y adolescente: ofrecer 200 – 450 ml al inicio y 200 – 400 por cada hora de ejercicio.

Adultos: Beber 30-60 minutos antes del inicio de la actividad y beber pequeñas cantidades de líquido (200 – 3000 ml) cada 15-20 minutos. El volumen total ingerido debe de ser alrededor de unos 500 – 1000 ml por cada hora de ejercicio.

CONTRAINDICACIONES

No usar en pacientes con diarrea, vómito intratable, íleo adinámico, insuficiencia renal, obstrucción intestinal, perforación intestinal o deshidratación severa.

INTERACCIONES

La absorción de Zinc puede verse reducida por suplementos de hierro, penicilina, preparaciones que contengan fosforo y tetraciclinas. Las dietas ricas en cereales, fibra y fosfato (productos lácteos) obstaculizan la absorción intestinal de zinc, igual que el café si se ingiere con las comidas.

REACCIONES ADVERSAS

Las soluciones orales de rehidratación oral raramente presentan reacciones adversas.

FERTILIDAD, EMBARAZO Y LACTANCIA

No hay datos o estos son limitados relativos al uso de Hydrflex 30 solución de rehidratación oral en mujeres embarazadas o durante la lactancia.

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y OPERAR MAQUINARIA.

Hydrflex 30 no afecta su capacidad para conducir o utilizar máquinas.

SOBREDOSIFICACIÓN

En casos de ingesta excesiva de soluciones orales de rehidratación puede aparecer edema a nivel palpebral que por lo general desaparece al interrumpir el tratamiento.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO

No consumir si el sello protector está roto. Una vez abierto el envase, consumir el contenido dentro de las 24 horas siguientes y desechar el sobrante.

Durante el embarazo o periodo de lactancia consulte a su médico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Conservar a una temperatura no mayor a 30°C.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

Si los síntomas persisten consulte a su médico.

Venta Libre

PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco x 500 ml

Caja x 24 frascos x 500 ml

B | BRAUN

Fabricado por:
B. Braun Medical Perú S.A.
Lima – Perú
R.U.C N°. 20377339461

Revisión: Febrero 2025 – Versión 004